

AUST - FACULTY OF PHARMACY

Explosion

علم الأدياء الدقيقة "1" "عملي"
د.محاسن القبجي

3

محاضرة

HYDROGEN TEAM

WRITTEN BY: Baraa AL-Doush

DESIGNED BY: Baraa AL-Doush

الديدان - Helminthes

الصفات العامة للديدان:



(١) تختلف الديدان عن الحيوانات الالوي ب:

« كونها مرئية

« متعددة الخلايا وذات حجم كبير

« تكون مغطاة بغلاف يحمي أعضائها الداخلية

(٢) تمتلك أجهزة :

« هضمية « اطراحية

« حركية « عصبية

(٣) معظم الديدان منفصلة الجنس بعضها خنثى

(٤) بعض الديدان تتم دورة حياتها على ثوي واحد والأخر على ثويين او اكثر

تصنيف الديدان:



تحت المملكة الحيوانية Subkingdom وتضم شعبتين:

شعبة الديدان المنبسطة <i>Platyhelminthes</i> وتحتوي	شعبة الديدان الحبلية <i>Nemathelminthes</i> وتحتوي
صف الشريطيات <i>Cestoda</i>	صف الحبليات <i>Nematoda</i>
صف المثقوبات <i>Trematoda</i>	

شعبة الديدان الحبلية - Nemathelminthes

الصفات العامة:



(١) مجموعة من الديدان لها:

« طور بالغ اسطواني الشكل

« نهاية امامية منبسطة

« نهاية خلفية مستقيمة عند الانثى ومدببة ومنحنية ناحية الوجه البطني ولها اشواك عند الذكر

(٢) محاطة بغلاف كيتيني يحمي أعضائها الداخلية

(٣) مجردة من الأجهزة:

« الحركية

« التنفس

« الدوران

(ع) لا تملك هذه الديدان أعضاء تثبيت خاصة

تتميز هذه الديدان عن بعضها اعتماداً على

نوع دورة الحياة

المميزات
الخاصة

الأبعاد

شكل الجسم

شكل بيوضها وبنيتها وعددها

تقسم الديدان الحبلية Nematoda

ديدان بيوضة و ولودة –

Oviviviparous

أحياناً تضع بيوض واحياناً اجنة

مثل: الأسطوانة البرازية

ديدان ولودة – Viviparous

تضع يرقات او اجنة

مثل: الشعرية الحلزونية

والخيطيات

ديدان بيوضة – Oviparous

تضع بيوض ناضجة وغير ناضجة






مثل: الحرقص والاسكاريس

جدول مقارنة الديدان الحبلية

اسم المتطفل	الأسكاريس <i>Ascaris lumbricoides</i>	الحرقرص <i>Enterobius vermicularis</i>	شعيرية الرأس <i>Trichuris trichiura</i>	الملقوات العفجية <i>Ancylostoma duodenale</i>	الأسطوانة البرازية <i>Strongyloides stercoralis</i>	الشعيرية الحلزونية <i>Trichinella spiralis</i>
الطول	أكبر الديدان الحبلية الذكر: 15 – 20 سم الانثى: 20 – 25 سم وتحتوي النهاية الامامية على: فم محاط بثلاثة شفاة	الذكر: 3-7 x 0.2 مم الانثى: 8-13 x 0.2 مم يحتوي الفم على: ثلاثة شفاة	الذكر: 4.5 – 3 سم الانثى: 5 – 3.5 سم الجزء الامامي: يشكل 5/3 من طول الدودة ويحتوي الفم والمرى الجزء الخلفي: يشكل 2/5 من طول الدودة	لونها ابيض وردي تمتلك محفظة فكية مسلحة بزوجين من الاسنان لتثبت على المخاطية العفجية للأمعاء الذكر: 9 – 11 مم الانثى: 13 – 10 مم قطرهم: 0.6 – 0.5 ملم	هي ديدان بيوضة ولودة الذكر: 0.7 مم الانثى: 1 مم	هي ديدان ولودة ديدان صغيرة الحجم الذكر: 1.5 ملم الانثى: 3 – 4 ملم
التطفل	الأمعاء الدقيقة عند الانسان	الأمعاء الغليظة خاصة عند الأطفال	الأمعاء الغليظة عند الانسان	الجزء العلوي للأمعاء الدقيقة عند الانسان	تتطفل الاناث فقط على الأمعاء الدقيقة ويمكنها ان تعيش بشكل حر في الطبيعة	الديدان البالغة: في الأمعاء الدقيقة الطور اليرقي: في العضلات
العدوى	لا يوجد عدوى ذاتية	يوجد عدوى ذاتية خارجية	لا يوجد عدوى ذاتية تحدث العدوى بالطعام الملوث بالبيض الناضجة	عن طريق الجلد او المخاطية الوضمية بواسطة البرقات الخطية تنطرح البيوض مع البراز وتطور خلال 24 ساعة تفقس ليخرج برقة ريدية Rhabditiform Larva تتحول الى برقة خيطية Filariform Larva وهي الشكل المعدي	-----	تتلول لحم الخنزير النيء حاو على برقات حية متكيسة
التشخيص	يتم فحص البراز اما برؤية البيوض المجهرية او برؤية الديدان كاملة بالعين المجردة	يتم برؤية الديدان كاملة بالبراز بالعين المجردة يجب استخدام طريقة غراهام لرؤية بيوض الحرقرص في البراز يمكن رؤية البيوض بالصدفة بالاراسب البولي	يتم برؤية البيوض بالبراز	يتم برؤية البيوض بالبراز	يتم برؤية البرقات في البراز بعد تكثيفها بطريقة بيرمان	يلجأ الى التشخيص المصلي غير المباشر او الخزعة النسيجية بسبب صعوبة التحري عن البرقات في البراز او الدم او السائل الدماغي الشوكي
البيضة	تنطرح البيضة الملقحة مع البراز وتكون غير ناضجة وتحتاج 4 اشهر للنضج بيضوية الشكل تبلغ ابعادها 45-75 x 25 – 50 ميكرون داخلها خللة حبيبية يحيط بها جدار مؤلف من غشائين داخلي املس وخارجي متموج البيوض الغير ملقحة اكبر حجماً من البيوض الملقحة ويصل الى 90 ميكرون	بيضوية الشكل شفافة لها وجه سطح محدب وآخر مسطح جدارها سميك ابعادها 60 – 30 x 30 – 20 ميكرون تحتوي داخلها جنيباً حبيباً ناضجاً يتحول الى برقة خلال ساعات	تشبه الليمونة لها قطبين و غلاف سميك محتوى مؤلف من جنين غير ناضج بشكل حبيبات مغلقة بغلاف جنيبي يفصل الجنين عن الغلاف الخارجي للبيضة ابعادها 50 - 25 ميكرون	بيضوية الشكل لها غلاف رقيق محتواها مؤلف من اربع خلايا محاط بغلاف جنيبي متعرج ابعادها 60 – 40 ميكرون	تشبه بيضة الملقوات العفجية لا تنطرح مع البراز وانما تنفقس داخل الأمعاء وتخرج يرقاتها مع البراز	-----
الشكل المعدي	-----	-----	-----	-----	البرقة الخيطية (500 x 15 ميكرون) عن طريق الفم والجلد وتسبب عدوى ذاتية داخلية وخارجية	-----
دورة الحياة	-----	-----	-----	-----	بيضة <--- برقة عصوية Rhabdotoides <--- برقة اسطوانية Strongyloides <--- دودة بالغة	-----
اليرقة	-----	-----	-----	-----	-----	تكون داخل خيس اهليلجي او ليموني يكون المحور الطويل موازي لطول الالياف العضلية يبلغ ابعاد الخيس 500 – 250 ميكرون

جدول مقارنة اشكال الديدان الحبلية وبيوضها

شعرية الرأس - *Trichuris trichiura*



الأسكاريس - *Ascaris lumbricoides*

